

令和7年度 第5回水稻病虫害発生予察調査結果集計表

地区名		調査 月日	調査 地点数	調 査 項 目 等													特記事項	
				葉いもち	紋枯病	斑点米カメムシ類						セジロウンカ	ツマグロヨコバイ	イネアオムシ	コバネイナゴ			ニカメイ チュウ
						(水田内)			(畦畔)			(水田内)	(水田内)	(水田内)	(水田内)	(畦畔)		
				確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数	地点 率(%)	確認 頭数	確認 地点数	地点 率(%)	確認 頭数	確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数	
上 越 市	安塚区	8月5日	10			1	10.0%	1	1	10.0%	1				2			
	浦川原区	8月6日	9			3	33.3%	11	4	44.4%	11	4			1			
	大島区	8月7日	9			5	55.6%	17	1	11.1%	5							
	牧区	8月5日	10			4	40.0%	14	1	10.0%	1				2			
	合併前上越	8月6日	32		2	8	25.0%	20	4	12.5%	44				1	2		
	柿崎区	8月6日	9		1	2	22.2%	16	1	11.1%	1	4						
	大潟区	8月5日	6		3	1	16.7%	2	1	16.7%	15							
	頸城区	8月5日	12		3	2	16.7%	2		0.0%		1			6	2		
	吉川区	8月5日	15			6	40.0%	26	7	46.7%	14				4			
	中郷区	8月7日	7		1		0.0%		2	28.6%	2				2	2		
	板倉区	8月6日	14		1	6	42.9%	11	4	28.6%	7	4			8			
	清里区	8月7日	10			2	20.0%	2	2	20.0%	15				2	1		
	三和区	8月6日	14		3	2	14.3%	5	5	35.7%	17	3			1		1カ所ごま葉枯病	
	名立区	8月6日	7		2	1	14.3%	1		0.0%					1			
	上越市 計			164	0	16	43	26.2%	128	33	20.1%	133	16	0	0	30	7	0
妙 高 市	新井地域	8月7日	15			2	13.3%	7	1	6.7%	2				6	1		
	妙高地域		6				0.0%			0.0%					2	1		
	妙高高原地域		3				0.0%			0.0%					1	1		
	妙高市 計			24	0	0	2	8.3%	7	1	4.2%	2	0	0	0	9	3	0
糸 魚 川 市	糸魚川地域	8月4日	17		1	9	52.9%	11	2	11.8%	5				2			
	青海地域		1			1	100.0%	7		0.0%								
	能生地域	8月5日	13		2		0.0%		4	30.8%	4				1			
	糸魚川市 計			31	0	3	10	32.3%	18	6	19.4%	9	0	0	0	3	0	0
合 計				219	0	19	55	25.1%	153	40	18.3%	144	16	0	0	42	10	0

※病虫害の発生状況と今後の対策について

いもち病・紋枯病の発生は平年に比べ少なくなっています。

斑点米カメムシの発生が平年に比べ多く発生しています。気温が高いと斑点米カメムシ類の水田侵入後の加害活動が活発になると予想されます。

薬剤防除の場合、剤型により散布適期が異なりますので、ラベル等を確認し適期に散布しましょう。