

地区名		調査 月日	調査 地点数	調 査 項 目 等																			特記事項	
				穂いもち	紋枯病	斑点米カメムシ類						セジロウンカ		ツマグロヨコバイ		イネアオムシ		コバネイナゴ				ニカメイチュウ		
						水田内			畦畔			水田内		水田内		水田内		水田内		畦畔				
						確認 地点数	確認 地点数	確認 地点数	地点 率 (%)	頭数	確認 地点数	地点 率 (%)	頭数	確認 地点数	頭数	確認 地点数	頭数	確認 地点数	頭数	確認 地点数	頭数			確認 地点数
上 越 市	安塚区	8月5日	10	0	0	1	10.0%	2	3	30.0%	7	0	0	0	0	0	0	5	12	0	0	0		
	浦川原区	8月6日	9	0	0	3	33.3%	8	1	11.1%	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0		
	大島区	8月7日	9	0	1	3	33.3%	4	1	11.1%	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0		
	牧区	8月5日	10	0	0	5	50.0%	10	2	20.0%	8	0	0	0	0	0	0	3	8	1	4	0		
	合併前上越	8月6日	32	0	0	8	25.0%	19	10	31.3%	51	0	0	0	0	1	1	6	6	3	4	0		
	柿崎区	8月6日	9	0	2	5	55.6%	7	2	22.2%	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大潟区	8月5日	6	0	0	2	33.3%	3	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	
	頸城区	8月5日	12	0	5	1	8.3%	1	3	25.0%	15	0	0	2	4	0	0	0	0	1	1	0	0	
	吉川区	8月5日	15	0	2	8	53.3%	46	5	33.3%	33	0	0	0	0	0	0	3	12	4	4	0	0	
	中郷区	8月7日	7	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	
	板倉区	8月6日	14	0	2	6	42.9%	13	5	35.7%	21	1	1	0	0	0	0	4	25	0	0	0	0	
	清里区	8月7日	10	0	0	1	10.0%	1	4	40.0%	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	
	三和区	8月6日	14	0	3	6	42.9%	11	5	35.7%	28	2	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	名立区	8月6日	7	0	0	2	28.6%	12	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
上越市 計			164	0	15	51	31.1%	137	41	25.0%	180	4	7	3	7	1	1	28	74	12	20	0	0	
妙 高 市	新井地域	8月7日	15	0	6	4	26.7%	8	3	20.0%	5	3	11	0	0	0	0	2	7	2	2	0	0	
	妙高地域		6	0	1	0	0.0%	0	1	16.7%	1	0	0	0	0	0	0	2	5	1	2	0	0	
	妙高高原地域		3	0	0	0	0.0%	0	2	66.7%	5	0	0	0	0	0	0	1	5	2	3	0	0	
	妙高市 計			24	0	7	4	16.7%	8	6	25.0%	11	3	11	0	0	0	0	5	17	5	7	0	0
糸 魚 川 市	糸魚川地域	7月31日	17	0	1	7	41.2%	22	5	29.4%	13	1	1	1	5	0	0	4	14	1	1	0	0	
	青海地域		1	0	0	1	100.0%	2	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	能生地域	8月3日	13	0	4	4	30.8%	6	3	23.1%	3	3	6	2	5	0	0	3	9	2	4	0	0	
	糸魚川市 計			31	0	5	12	38.7%	30	8	25.8%	16	4	7	3	10	0	0	7	23	3	5	0	0
合 計			219	0	27	67	30.6%	175	55	25.1%	207	11	25	6	17	1	1	40	114	20	32	0	0	

※病虫害の発生状況と今後の対策について

いもち病・紋枯れ病の発生は平年に比べ少なくなっています。
県内では7月29日に斑点米カメムシ類多発生に関する注意報が発表されました。水稻の出穂後は畦畔等の草刈りを適宜行い、カメムシ類の発生源をなくしましょう。